

## Upozornění pro uživatele solárií dle ČSN 60335-2-27 ed.4

Uživatel solárií je povinen dodržovat následující opatření:

- Vždy používat ochranné brýle (kontaktní čočky a sluneční brýle nejsou náhradou ochranných brýlí)
- Před opalováním se důkladně odličtí a nepoužívat žádné ochranné prostředky pro běžné opalování na slunci (mohou mít opačný účinek)
- Konzultovat s obsluhou lékařské okolnosti a užívané léky, na které by mohlo mít zásadní vliv působení ultrafialové záření
- Vyčkat nejméně 48 hodin mezi prvním a druhým opalováním v soláriu
- Neopalovat se na sluníčku a v soláriu během jednoho dne
- Dodržovat doporučení obsluhy týkající se doby opalování, intervalu a vzdálenosti od světelného zdroje
- Při trvalých opuchlinách nebo bolestech souvisejících s pokožkou, nebo při vzniku změn v pigmentových skvrnách okamžitě vyhledat lékařskou pomoc
- Chránit před ozářením citlivé části pokožky (např.: jizvy, tetování, genitálie, ...)

Ultrafialové záření ze slunce nebo solária může způsobit při nesprávném postupu a nedostatku informací nevratné poškození očí a pokožky. Po nadměrném ozáření se pokožka může spálit, při opakovaném nadměrném ozáření může dojít k předčasnému stárnutí pokožky, případně může dojít až ke zvýšenému nebezpečí tvorby kožních nádorů. U nechráněných očí může být vyvolán zánět, případně poškození sítnice a v krajním případě může vzniknout šedý zákal. V případech výrazné individuální citlivostní nebo alergické reakce na ultrafialové záření se doporučuje před začátkem expozice poradit se s lékařem.

Nastanou-li během 48 hodin od první expozice nějaké nežádoucí účinky, jako např. svědění, měla by být vyhledána konzultace s lékařem. Expozice by neměly překročit minimální výši expozice UV záření, které způsobuje zčervenání pokožky (1 MED).

### UV zářiče nesmějí být používány osobami:

- mladšími 18 let
- pod vlivem alkoholu
- se sklonem k tvorbě pit
- s přírodní červenou barvou vlasů
- se skvrnami s abnormálním odbarvením pokožky
- které mají na těle více než 16 mateřských znamének o průměru 2 mm a více
- které mají asymetrická a nepravidelná znaménka větší než 5 mm v průměru s kolísavou pigmentací a nepravidelně ohraničená
- trpícími na úžeh
- které nejsou schopné se vůbec opalovat nebo se neopálí bez spálení pokožky
- které se při vystavení slunečním paprskům snadno spálí
- které mají v anamnéze časté těžké spálení sluncem v dětském věku
- které mají nebo v minulosti měly rakovinu kůže neb které mají predispozici ke vzniku rakoviny kůže
- které mají první stupeň vzhledem k anamnéze melanomu
- v lékařské péči z důvodu onemocnění, které souvisí s citlivostí na světlo
- užívajícími léky vyvolávající citlivost na světlo

### Prohlášení o výměně trubíc

Výměnu trubíc ve Studio Zlatníky provádí odborně způsobilá osoba, která má osvědčení pro práci ve smyslu vyhlášky 50/78 Sb. Trubice používané ve Studio Zlatníky mají dle technického listu výrobcem danou životnost 650 – 1000 provozních hodin (v závislosti na typu trubice a odpovídající normě ČSN EN 60335-2-27 v platném znění).

Stav provozních hodin trubíc na každém soláriu je detailně evidován a sledován obslužným programem solárií, který zaznamenává každé spuštění solária i výměnu trubíc. Trubice jsou zpravidla měněny při dosažení 90% životnosti dané výrobcem. Tím je zaručeno, že použití solária je vždy bezpečné. Dosažená doba životnosti (počet provozních hodin) trubíc solária, i výrobcem daná doba životnosti trubíc použitých v soláriu je na požádání k nahlédnutí u obsluhy.